

SCOTCH TEST (TEST DI GRAHAM PER ENTEROBIASI INTESTINALE)

Per l'esecuzione dello scotch test per la ricerca delle uova di ossiuri è necessario osservare la seguente procedura:

- *Vengono consegnati vetrini portaoggetti ad un genitore del bambino che deve eseguire l'esame, insieme alla spiegazione della corretta procedura da seguire per l'esame.*
- *La sera precedente l'esame non applicare nella zona anale alcun tipo di crema.*
- *Al mattino, prima che il paziente defechi e/o si sia lavato, fare aderire bene lo scotch (lunghezza 4-5 cm, perfettamente trasparente) alla zona perianale.*
- *Dopo distacco dalla zona perianale del paziente, far aderire bene lo scotch al vetrino portaoggetti e consegnare il tutto il più presto possibile al laboratorio analisi in busta chiusa.*
- *A causa del ciclo vitale degli ossiuri, è consigliabile ripetere il test per 3 volte, in giorni consecutivi.*
- *I vetrini vanno consegnati al laboratorio analisi negli orari di apertura della sala prelievi e comunque non oltre le ore 11.00.*

Tenere ben presente che il vetrino potrebbe essere tagliente, prestare quindi la massima attenzione durante le operazioni di preparazione.